



Infekcja FeLV- „Pocałunek Śmierci”

ABCD zaleca badania przed szczepieniem, ale z „ostrożną interpretacją” wyników

Monachium, 10 grudnia – Europejski Komitet Doradczy do Spraw Chorób Kotów (ABCD) opublikował dzisiaj pierwsze europejskie wytyczne na temat zapobiegania i leczenia infekcji wirusem białaczki kotów (ang. FeLV). Wirus ten występuje na całym świecie i jest przenoszony głównie w czasie bliskiego, „przyjacielskiego” kontaktu, jak wzajemna pielęgnacja i używanie tej samej miski, chociaż może być również przenoszony przez ugryzienie. Odsetek zakażonych kotów w większości krajów europejskich jest niewielki (około 1% lub poniżej), chociaż w niektórych regionach przekracza 20%.

Młode koty szczególnie podatne

Czynniki ryzyka obejmują młody wiek, duże zagęszczenie populacji (gospodarstwa domowe lub schroniska zamieszkiwane przez wiele kotów), wychodzenie na dwór (kontakt z zakażonymi kotami) i powszechne występowanie infekcji w okolicy.

„Sprawny układ odpornościowy może pokonać infekcję, lecz w warunkach stresu sfłoczenia, aż jedeń trzecia kotów może zostać trwale zakażonych wirusem”, wyjaśnia profesor Hans Lutz (Wydział Weterynarii w Zurychu), członek ABCD i uznany na całym świecie specjalista od retrowirusów kotów. *„Może to prowadzić do wystąpienia licznych objawów klinicznych, z których najbardziej widoczne to immunosupresja, niedokrwistość i chłoniak. Większość z zakażonych kotów pada w ciągu dwóch lat od postawienia diagnozy”.*

Młode zwierzęta są szczególnie podatne na zakażenie, a z wiekiem wrażliwość maleje.

Szczepienia – tylko w przypadku ryzyka

Szczepionki przeciwko FeLV to jedyne dostępne obecnie w Europie szczepionki przeciwko retrowirusom, włączając w to medycynę ludzką. Zaleca się szczepienie zagrożonych kotów, przede wszystkim młodych zwierząt wychodzących na dwór i mających kontakt z innymi kotami na obszarach z dużą liczbą przypadków infekcji. Kocięta należy szczepić po raz pierwszy w wieku 9 i 12 tygodni, a następnie co roku w dawkach przypominających. Biorąc pod uwagę mniejszą podatność starszych kotów, ABCD zaleca podawanie dawek przypominających nie częściej niż co dwa-trzy lata w przypadku kotów w wieku 3 lat lub starszych – i jedynie w przypadku ryzyka.

Badanie przed szczepieniem – ostrożna interpretacja wyników

Jeżeli dane z wywiadu tego nie wyjaśnią, kot powinien być zbadany na obecność antygenu FeLV we krwi przed szczepieniem, ponieważ immunizacja kota z wirusiem jest bezcelowa. Jednakże dodatnie wyniki uzyskane przy użyciu „szybkich” testów powinny być interpretowane ostrożnie, szczególnie w przypadku zdrowych kotów i na obszarach, gdzie liczba zakażonych zwierząt jest niewielka: prawdopodobieństwo otrzymania fałszywego wyniku dodatniego wzrasta wraz ze spadkiem odsetka zakażonych kotów w populacji. Dlatego ABCD zaleca, aby zawsze potwierdzać

nieoczekiwany wynik dodatni, najlepiej za pomocą poszukiwania prowirusa metodą PCR w wiarygodnym laboratorium.

Ponadto, prawdziwy dodatni wynik może wskazywać na przejściową wiramię, która występuje u około 30-40% kotów, u których po ustąpieniu wiramii nie ma ryzyka rozwoju choroby związanej z FeLV.

Postępowanie z kotami zakażonymi FeLV

Koty zakażone FeLV w stanie stałej wiramii należy izolować, aby zapobiec zakażeniu innych zwierząt. Dla ich własnego dobra, koty zakażone FeLV należy izolować od kotów chorych na inne choroby zakaźne i poddawać regularnym badaniom klinicznym; należy również przeprowadzać pełne badania hematologiczne, biochemiczne i analizę moczu. Wykazano, że leczenie zwierząt chorych na białaczkę kocim interferonem omega poprawia ich stan kliniczny i zwiększa przeżywalność, choć nie zlikwiduje wiramii.

Dalsze szczegółowe informacje oraz pełny tekst wytycznych ABCD dotyczących białaczki kotów znajdują się na stronie www.abcd-vets.org. Wytyczne te zawierają również zalecenia dotyczące specyficznych przypadków, takich jak prowadzenie hodowli kotów i postępowanie z kotami poddawanych leczeniu kortykosteroidami.

Wytyczne dotyczące FeLV zostały przyjęte na szóstym posiedzeniu ABCD w Monachium (Niemcy) 24-26 października 2007 r. Na zgromadzeniu zespół omawiał również zagadnienie niedoboru immunologicznego kotów (ang. FIV) i wścieklizny u kotów, dla których to infekcji wytyczne są obecnie w fazie przygotowań.

Uwagi dla wydawców

- Europejski Komitet Doradczy ds. Chorób Kotów (ABCD) jest niezależnym zespołem 17 lekarzy weterynarii z dziesięciu państw Europy, wybitnych ekspertów w dziedzinie immunologii, wakcynologii i/lub chorób kotów. ABCD został powołany w celu opracowania wytycznych odnośnie zapobiegania i leczenia głównych chorób zakaźnych kotów w Europie w oparciu o najnowszy stan wiedzy.
- Szczegółowe informacje na stronie www.abcd-vets.org.
- Wywiady, zdjęcia (wykładowców, chorych kotów etc.) i logo ABCD są dostępne na życzenie.
- Firma Merial, zajmująca się produkcją leków weterynaryjnych, przyczyniła się do powołania ABCD i wspiera tę inicjatywę finansowo. Merial jest światowym liderem w dziedzinie leków weterynaryjnych i innowacyjną firmą, która dostarcza szeroką gamę produktów poprawiających stan zdrowia i zapewniających dobrostan oraz podnoszących wydajność wielu gatunków zwierząt. Więcej informacji na stronie www.merial.com.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z:

Karin de Lange – Rzecznik prasowy / prasa weterynaryjna,

Telefon: +33 299 07 87 10, Email: karin.delange@abcd-vets.org