

## **EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA FELINA NO ES UNA SENTENCIA DE MUERTE**

### **ABCD: “No sacrifique a un gato sólo por obtener resultados positivos en la detección del FIV”**

Gante, 25 de marzo – El European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) ha publicado hoy las primeras directrices europeas sobre el manejo y la prevención frente a la infección por el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV).

La infección por el FIV comporta una fase de latencia o “asintomática” prolongada, que puede durar meses o años o, incluso, toda la vida del animal. Durante esta fase, el gato infectado no presenta prácticamente signos clínicos (como gingivoestomatitis, rinitis crónica, linfadenopatía, glomerulonefritis inmunomediada y pérdida de peso). Puede que muchos de los signos clínicos no estén asociados directamente con el FIV, por lo que es importante comprobar con regularidad la presencia de infecciones secundarias en los gatos infectados por este virus.

### **Un resultado positivo en la detección del FIV no implica necesariamente una sentencia de muerte**

Los resultados positivos obtenidos en pruebas realizadas en la clínica y en una población con baja prevalencia (por ejemplo, gatos jóvenes, gatos que viven exclusivamente en el interior de las casas o gatos de criaderos) siempre deben confirmarse en un laboratorio.

*“Nunca debe practicarse la eutanasia a un gato sólo por el hecho de obtener un resultado positivo en una prueba de detección del FIV”, afirma Margaret Hosie (Universidad de Glasgow), miembro del ABCD y una especialista en inmunodeficiencia felina de prestigio internacional. “Los gatos infectados por el FIV pueden tener una buena esperanza de vida si se les prescribe un tratamiento inmediato para las infecciones secundarias”.*

Las pruebas de detección del FIV deben interpretarse con cuidado en los gatitos, ya que los gatitos jóvenes procedentes de madres infectadas pueden ser seropositivos por la presencia de anticuerpos maternos. En estos casos deben repetirse de nuevo las pruebas aproximadamente a las 16 semanas de edad. En casos excepcionales, los anticuerpos maternos pueden persistir hasta los 6 meses, por lo que los gatitos que resulten seropositivos a las 16 semanas deben someterse de nuevo a las pruebas a los dos meses.

### **Manejo: monitorización y tratamiento inmediato**

*“En los gatos infectados por el FIV deben realizarse revisiones periódicas al menos cada seis meses, de forma que si aparecieran signos clínicos, el tratamiento podría iniciarse de inmediato”* añade la Dra. Hosie. Estas revisiones deben incluir la monitorización del peso del animal y análisis clínicos rutinarios como pruebas hematológicas y bioquímicas.

Los posibles riesgos y beneficios de una vacunación rutinaria en gatos infectados por el FIV deben evaluarse en función de cada caso concreto. Por ejemplo, el riesgo de infección es muy bajo en gatos de edad avanzada que viven exclusivamente en el interior de las casas y que ya han sido vacunados con anterioridad, por lo que en esos casos puede que sea recomendable evitar una

vacunación de refuerzo. Por el contrario, la vacunación es muy recomendable en gatos infectados por el FIV que presentan un alto riesgo de exposición a otros agentes patógenos (por ejemplo, gatos que tienen total libertad para entrar y salir de casa).

### **Prevalencia: hasta un 44% en gatos enfermos**

El FIV, presente de forma endémica en todo el mundo, fue aislado por primera vez en 1986. Existen cinco subtipos distintos, siendo los subtipos A y B los más habituales en Europa. Su prevalencia es muy variable dependiendo de la región, con estimaciones entre un 1 % y un 14 % en gatos sanos, y de hasta un 44 % en gatos enfermos. La infección se transmite, principalmente, a través de la saliva de una mordedura. Fuera del hospedador, el virus tan sólo sobrevive unos cuantos minutos y es sensible a todos los desinfectantes, incluido el jabón común.

Para más información y descargarse el texto completo de las directrices sobre la inmunodeficiencia felina del ABCD visite la web [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org). Estas pautas también dan recomendaciones para situaciones específicas tales como criaderos, y gatos con un tratamiento de corticoesteroides.

Estas pautas sobre el FIV se adoptaron en el sexto encuentro del ABCD, llevado a cabo en Munich (Alemania) del 24 al 26 de octubre de 2007. En dicho encuentro la comisión también debatió sobre la rabia en gatos, enfermedad para la que actualmente se están preparando unas directrices a seguir.

---

### **Notas para los editores**

- El European Advisory Board on Cat Diseases es una comisión independiente de 17 destacados veterinarios de diez países europeos, expertos en inmunología, vacunación y/o medicina felina. El ABCD se constituyó para compilar las directrices de prevención y control de las principales enfermedades infecciosas felinas de Europa, basándose en el conocimiento científico actual.
- Para mayor información sobre la historia del ABCD visite la web [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org).
- Pueden disponer, si así lo solicitan, de entrevistas, fotos (de los ponentes, gatos afectados) y del logo del ABCD.
- La compañía Merial de Salud Animal ha colaborado en la constitución del ABCD europeo y mantiene esta iniciativa mediante financiación. Merial es una compañía innovadora, líder a nivel mundial que proporciona una gama completa de productos para mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de una gran variedad de animales. Para más información, visite la web [www.merial.com](http://www.merial.com).

### **Para obtener más información por favor contacte con:**

Karin de Lange DVM MRCVS – Jefe de Prensa/Prensa Veterinaria:

Teléfono: + 33 299 07 87 10

Correo electrónico: [karin.delange@abcd-vets.org](mailto:karin.delange@abcd-vets.org)