

FIV: GEEN DOODSTRAF!

ABCD: “Laat nooit een kat inslapen alleen maar omdat-ie positief is voor FIV!”

Gent, 25 maart – De Europese adviesraad voor kattenziekten (ABCD) maakte vandaag de eerste richtlijnen bekend voor de preventie en behandeling van infecties door het feline immunodeficiëntie virus (FIV).

Infectie door FIV is gekenmerkt door een lange latente of asymptomatische fase die maanden of jaren, en soms zelfs levenslang kan duren. Tijdens deze fase blijft de kat relatief vrij van de typische ziekteverschijnselen (zoals chronische tandvleesontsteking, chronische rhinitis, lymfadenopathie, immuun-gemedieerde glomerulonefritis en gewichtsverlies). Veel klinische verschijnselen worden niet altijd direct door FIV veroorzaakt, maar treden op als gevolg van de immunodeficiëntie. Het is dus van belang om FIV-positieve katten regelmatig te onderzoeken op secundaire infecties.

FIV positief? Niet noodzakelijk de doodstraf

Positieve resultaten verkregen met ‘in-huis’ of sneltesten bij katten uit een populatie met een lage prevalentie (bijv. jonge katten zonder uitloop of fokdieren) dienen altijd bevestigd te worden door een laboratorium.

“Katten moeten nooit geëuthanaseerd worden uitsluitend op basis van een positieve FIV-test”, benadrukt Margaret Hosie (Universiteit van Glasgow), ABCD lid en internationaal erkend specialist op het gebied van FIV. “FIV-geïnfecteerde katten hebben veelal een goede levensverwachting zolang ze vroegtijdig behandeld worden tegen secundaire infecties”.

FIV testen in kittens dienen ook met zorg geïnterpreteerd te worden, aangezien jonge kittens van FIV-geïnfecteerde poezen seropositief kunnen zijn door de maternale antistoffen. Zulke kittens moeten op 16 weken opnieuw getest worden. In zeldzame gevallen kunnen maternale antistoffen tot zes maanden aanwezig blijven, en kittens met een seropositieve uitslag op 16 weken moeten dan twee maanden later nogmaals opnieuw getest worden.

Management: regelmatig checken en tijdig behandelen

“FIV-geïnfecteerde katten dienen minstens om de zes maanden een regelmatige diergeneeskundige ‘check-up’ te krijgen, indien er ziektesymptomen zouden verschijnen kan er vroegtijdig een behandeling worden ingezet.”, voegt Dr Hosie toe. Bij een check-up hoort een gewichtscontrole en routine laboratoriumonderzoek zoals een bloedbeeld en biochemie.

De eventuele risico's en voordelen van routinevaccinatie van FIV-geïnfecteerde katten dienen voor elk geval apart overwogen te worden. Het infectierisico is bijvoorbeeld bijzonder laag bij oudere katten zonder buitenloop die voorheen regelmatig gevaccineerd werden; in dat geval is het waarschijnlijk aan te raden om geen ‘booster’-vaccinaties te geven. Aan de andere kant is vaccinatie sterk aan te raden bij FIV-positieve katten met een hoge kans op blootstelling aan andere pathogenen (bijv. katten met vrije uitloop).

Prevalentie: tot 44% in zieke katten

FIV, een wereldwijd endemisch virus, werd voor het eerst geïsoleerd in 1986. Er bestaan vijf verschillende subtypes. Subtypes A en B komen het meeste voor in Europa. De prevalentie is sterk variabel, met schattingen van 1 à 14% bij gezonde

katten en tot 44% bij zieke katten. De infectie wordt voornamelijk overgedragen via het speeksel tijdens het bijten. Het virus kan slechts enkele minuten buiten de gastheer overleven en is gevoelig voor alle ontsmettingsmiddelen inclusief gewone zeep.

Verdere informatie of downloads van de volledige tekst van de ABCD FIV-richtlijnen zijn beschikbaar (in het Engels) op www.abcd-vets.org. Deze richtlijnen geven ook aanbevelingen voor bijzondere situaties zoals: in kattenfokkerijen en bij katten die onder behandeling staan van corticosteroiden.

De richtlijnen voor FIV werden aangenomen op de zevende vergadering van de ABCD, gehouden in München (Duitsland) op 24-26 oktober jl. Tijdens de vergadering besprak het panel tevens rabiës bij katten, waarvoor richtlijnen momenteel in voorbereiding zijn.

Voor de redactie:

- De *Europese Advisory Board on Cat Diseases* (Europese adviesraad voor kattenziekten, ABCD) is een onafhankelijk panel van 17 veterinaire experts uit tien Europese landen, met een specialistische kennis op het gebied van immunologie, vaccinologie en/of kattengeneeskunde. Doel van de ABCD is het opzetten van richtlijnen voor de preventie en aanpak van de belangrijkste besmettelijke kattenziekten in Europa, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis.
- Zie www.abcd-vets.org voor gedetailleerde achtergrondinformatie.
- Interviews, foto's en het ABCD logo zijn op aanvraag beschikbaar.
- Veterinair farmaceutisch bedrijf Merial heeft de Europese ABCD helpen oprichten en ondersteunt dit initiatief op financiële wijze. Merial is een wereldleidend bedrijf gericht op innovatie met een uitgebreid assortiment aan producten ter verbetering van de gezondheid, het welzijn en de productie van een groot aantal diersoorten. Voor meer informatie, zie www.merial.com.

Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met:

Karin de Lange DVM – Persvoorlichter ABCD / Diergeneeskundige pers

Telefoon: + 33 299 07 87 10

E-mail: karin.delange@abcd-vets.org