



FIV: TO NIE WYROK ŚMIERCI

ABCD: "Nigdy nie usypiaj kota tylko dlatego, że wynik testu na FIV jest dodatni"

Gandawa, 25 marca – Europejski Komitet Doradczy do Spraw Chorób Kotów (ABCD) opublikował pierwsze europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania i leczenia zakażenia wirusem niedoboru immunologicznego kotów (ang. FIV).

W przebiegu infekcji FIV występuje długa faza utajona czyli bezobjawowa, która może trwać miesiące lub lata, albo nawet całe życie kota. W tej fazie nie występują wyraźne objawy kliniczne (do których mogą należeć przewlekłe zapalenie dziąseł i jamy ustnej, przewlekły katar, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie kłębuszków nerkowych na tle immunologicznym i utrata masy ciała). Wiele objawów klinicznych może być spowodowanych nie przez sam przez FIV, lecz wynika wtórnych zakażeń, do których usposabia infekcja FIV.

Dodatni wynik testu FIV? To nie musi oznaczać wyroku śmierci

Dodatnie wyniki testów uzyskane w populacjach o niskim rozpowszechnieniu zakażenia (np. młode koty, zwierzęta nie wychodzące na dwór, w tym koty w hodowlach) powinny zawsze zostać potwierdzone przez laboratorium.

„Nigdy nie należy usypiać kotów tylko dlatego, że wynik testu na zakażenie FIV jest dodatni” – zauważa Margaret Hosie (Uniwersytet Glasgow), członek ABCD i międzynarodowy ekspert do spraw FIV. „Jeśli koty zakażone FIV są niezwłocznie poddawane odpowiedniemu leczeniu infekcji wtórnych, mogą mieć przed sobą jeszcze długie życie.”

Wyniki testów na FIV u kociąt należy traktować z dużą ostrożnością, ponieważ potomstwo kociąt zakażonych FIV może być serododatnie z powodu występowania przeciwciał matczynych. Kocięta należy powtórnie przebadać, gdy osiągną mniej więcej 16. tydzień życia. W rzadkich przypadkach matczyne przeciwciała mogą utrzymywać się do sześciu miesięcy i kocięta, które były serododatnie w wieku 16 tygodni powinny zostać powtórnie przebadane dwa miesiące później.

Postępowanie: badaj i niezwłocznie lecz

„Koty zakażone FIV powinny być poddawane kontrolnym badaniom weterynaryjnym przynajmniej co sześć miesięcy, aby można było rozpocząć leczenie, gdy tylko pojawią się objawy kliniczne” – dodaje dr Hosie. W czasie badań kontrolnych należy sprawdzać masę ciała i przeprowadzać rutynowe testy laboratoryjne – hematologiczne i biochemiczne.

Dla każdego bezobjawowego nosiciela FIV należy przeprowadzić analizę zagrożeń i korzyści z rutynowego szczepienia przeciw innym chorobom zakaźnym. Na przykład ryzyko takich chorób jest bardzo niskie w przypadku uprzednio szczepionych, starszych kotów, nie wychodzących na dwór; dlatego być może w takich przypadkach należy zrezygnować ze szczepień przypominających. Szczepienie jest natomiast zdecydowanie zalecane w przypadku nosicieli FIV, u których prawdopodobieństwo kontaktu z innymi zarazkami jest znaczne (np. koty żyjące na swobodzie).

Częstość występowania: do 44% u chorych kotów

Występujący na całym świecie FIV został po raz pierwszy wyizolowany w 1986 r. Istnieje pięć podtypów wirusa, przy czym w Europie najczęściej występują podtypy A i

B. Rozpowszechnienie FIV jest bardzo różne w rozmaitych okolicach i populacjach. Szacunkowo wynosi od 1 do 14% u zdrowych kotów i do 44% u kotów chorych. Do zakażenia dochodzi przede wszystkim przez ślinę przy okazji ugryzienia. Poza organizmem gospodarza wirus przeżywa tylko kilka minut i jest wrażliwy na działanie wszystkich środków dezynfekujących, w tym zwykłego mydła.

Dalsze szczegółowe informacje oraz pełny tekst zaleceń ABCD dotyczących wirusowego niedoboru immunologicznego kotów zamieszczono na stronie www.abcd-vets.org. Wytyczne te uwzględniają również szczególne sytuacje, takie jak prowadzenie hodowli kotów i postępowanie z kotami poddawany mi leczeniu kortykosteroidami.

Zalecenia dotyczące FIV zostały przyjęte na szóstym posiedzeniu ABCD w Monachium (Niemcy) 24-26 października 2007 r. Na zgromadzeniu tym zespół omawiał również zagadnienie wścieklizny u kotów, dla której wytyczne są obecnie w fazie przygotowań.

Uwagi dla wydawców

- Europejski Komitet Doradczy ds. Chorób Kotów (ABCD) jest niezależnym zespołem 17 lekarzy weterynarii z dziesięciu państw Europy, wybitnych ekspertów w dziedzinie immunologii, wakcynologii oraz/lub chorób kotów. ABCD został powołany w celu opracowania wytycznych dotyczących zapobiegania i leczenia głównych chorób zakaźnych kotów w Europie przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy.
- Szczegółowe informacje na stronie www.abcd-vets.org.
- Wywiady, zdjęcia (wykładowców, chorych kotów etc.) i logo ABCD są dostępne na życzenie.
- Firma Merial, zajmująca się produkcją leków weterynaryjnych, przyczyniła się do powołania ABCD i wspiera tę inicjatywę finansowo. Merial jest światowym liderem w dziedzinie leków weterynaryjnych i innowacyjną firmą, która dostarcza szeroką gamę produktów poprawiających stan zdrowia i zapewniających dobrostan oraz podnoszących wydajność wielu gatunków zwierząt. Więcej informacji na stronie www.merial.com.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt z:

Karin de Lange – Rzecznik prasowy / prasa weterynaryjna,
Telefon: + 33 299 07 87 10
Email: karin.delange@abcd-vets.org