

## **FELINE PANLEUKOPENIE: EN ALVORLIG SYGDOM ABCD eksperter anbefaler revaccinationer hvert tredje år**

Haarlem, 13. juli 2006 - Et interval på mindst tre år mellem revaccinationer er normalt tilstrækkeligt til at bekæmpe feline panleukopeni i henhold til nye retningslinier, der udgives i dag af European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD), såfremt disse vaccinationer gives i henhold til den anbefalede protokol.

Feline panleukopeni har haft ry for at udslutte lokale kattebestande og er derfor lejlighedsvis blevet omtalt som "Kattepest". Dødeligheden fra denne yderst smitsomme parvovirus er høj for modtagelige katte og kan overstige 90% for killinger.

### **Indendørs katte er også truede**

*"Indirekte kontakt er den mest almindelige måde, hvorpå katte bliver smittet, så katte, der lever indendørs, er også truede,"* i henhold til Uwe Truyen (Leipzig, Tyskland), som er medlem af ABCD og internationalt anerkendt specialist i parvovirus. *"Virusset, feline panleukopeni, er yderst resistent og kan overleve i miljøet i adskillige måneder eller endda i helt op til et år, hvilket betyder, at katte ikke behøver at komme i kontakt med andre katte for at blive smittet.*

### **Anbefalet vaccinationsprotokol**

ABCD anbefaler, at en vaccinationsprotokol mod feline panleukopeni skal bestå af to vaccinationer af killinger, henholdsvis 9 og 12 uger gamle, efterfulgt af den første revaccination et år senere. Hvis dette grundlæggende program udføres korrekt, kan de efterfølgende revaccinationer normalt gives med mindst tre års mellemrum.

ABCD understreger dog, at maternelle antistoffer (MDA) mod feline panleukopenivirus kan persistere længere, end man tidligere har troet, og eventuelt kan neutralisere vaccineantigenet og derved forhindre aktiv immunisering. Det er især killinger fra miljøer med stor infektionsrisiko, som f.eks. kattehjem, eller som er født af hunkatte, der regelmæssigt er blevet vaccineret, f.eks. hos katteopdrættere, der stadig kan have MDA i kroppen i 16 eller endda 20 ugers alderen. I disse situationer anbefales det at give en tredje vaccination i fire måneders alderen.

Til voksne katte med ukendt vaccinationshistorie er det tilstrækkeligt med en enkelt indsprøjtning efterfulgt af revaccination efter et år. Derefter kan der gives revaccinationer med tre eller flere års mellemrum.

### **Immunitet i flokken er for lille**

*"Takket være effektive vacciner ses sygdommen sjældent i dag. Men virus ligger stadig på lur og kan - og gør det da også - af og til dukke uventet op,"* tilføjer Professor Marian Horzinek (Utrecht, NL), der er formand for ABCD. *"For at holde skak med sygdommen skal den procentdel af en kattebestand, der*

*vaccineres, være så høj som muligt – i hvert fald højere end de 30% den antages at være i dag.”*

Udover understøttende behandling (væske, antibiotika og eventuelt antisera eller antivirale midler), findes der ikke nogen ‘kur’ for sygdommen, og kattene kan dø til trods for intensiv dyrlægebehandling. Men de vacciner, der i øjeblikket forefindes på markedet, er yderst virksomme og giver kattene effektiv beskyttelse mod sygdommen, såfremt de gives i henhold til den anbefalede protokol.

Du kan finde yderligere oplysninger og downloade fyldestgørende retningslinier fra ABCD om Felin panleukopeni ved at besøge [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org). Disse retningslinier giver desuden anbefalinger om bestemte situationer, som f.eks. immunsvækkede katte, katteopdrættere samt katte, der er i kortikosteroid behandling.

Retningslinierne for felin panleukopeni blev vedtaget på et tredje møde i ABCD, der blev afholdt i Haarlem (NL) den 8.-9. juni 2006. På mødet diskuterede panelet desuden felin herpesvirus. Retningslinier for denne sygdom er i øjeblikket under udarbejdelse.

---

## Notis til redaktøren

- *European Advisory Board on Cat Diseases* er et uafhængigt panel, der består af 17 ledende veterinærer fra ti europæiske lande med ekspertise i immunologi, vaccinologi og/eller katteremedicin. ABCD blev etableret til at udarbejde retningslinier til forebyggelse og regulering af alvorlige, infektiøse sygdomme blandt katte i Europa på baggrund af aktuell videnskabelig viden.
- Besøg venligst [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org) for at finde nærmere baggrundsoplysninger
- Interviews, billeder og ABCD-logoet fås efter anmodning.
- Medicinalfirmaet Merial har været med til at etablere det europæiske ABCD og støtter dette initiativ økonomisk. Merial er en verdensførende virksomhed inden for veterinær medicin og udbyder af et alsidigt udvalg af produkter til forebyggelse og helbredelse af en lang række sygdomme hos mange forskellige dyrearter. Yderligere oplysninger kan findes på [www.merial.com](http://www.merial.com)

## Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Karin de Lange - Presseattaché / Veterinærpressen:  
Telefon: + 33 299 07 87 10  
Email: [karin.delange@abcd-vets.org](mailto:karin.delange@abcd-vets.org)

eller:

Mars Webb - Kommunikationsleder/Forbrugermedier:  
Telefon: + 44 208 835 0372  
Email: [mars.webb@abcd-vets.org](mailto:mars.webb@abcd-vets.org)