

## **PANLEUCOPENIA FELINA: LA ENFERMEDAD MORTAL Los expertos del ABCD recomiendan vacunaciones de refuerzo cada tres años**

Haarlem, 13 julio 2006 - Normalmente un intervalo mínimo de tres años para las vacunaciones de refuerzo es suficiente para controlar la panleucopenia felina, según las nuevas directrices publicadas hoy por el Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) europeo, siempre y cuando, se apliquen las vacunaciones iniciales según el protocolo recomendado.

La panleucopenia felina es bien conocida por haber hecho desaparecer poblaciones locales de gatos, y se ha llegado a denominar como "la peste felina". Las tasas de mortalidad de este parvovirus altamente contagioso son elevadas y pueden superar el 90% en los gatitos.

### **Los gatos que viven en casa también están en riesgo**

Según el profesor Uwe Truyen (Leipzig, Alemania), miembro del ABCD y especialista de reconocimiento internacional en parvovirus: *"el contacto indirecto es la manera más frecuente de que un gato se infecte, por lo que los gatos que viven en casa también están en riesgo"*. "Debido a su elevada resistencia, el virus de la panleucopenia felina puede sobrevivir en el medio varios meses, o incluso un año, lo que implica que los gatos no necesitan entrar en contacto con otros gatos para infectarse".

### **Protocolo de vacunación recomendado**

El programa de vacunación recomendado por el ABCD para la panleucopenia felina consiste en la vacunación del gatito a las nueve y las 12 semanas de edad, seguida de un primer refuerzo al año siguiente. Si este programa básico se lleva a cabo de manera correcta, pueden aplicarse normalmente vacunaciones de refuerzo posteriores a intervalos de, como mínimo, tres años.

Sin embargo, el ABCD destaca que los anticuerpos de origen materno (MDA, en inglés "Maternally Derived Antibodies") frente al virus de la panleucopenia felina pueden persistir durante más tiempo del que se creía anteriormente, y pueden llegar a neutralizar el antígeno vacunal, impidiendo así la inmunización activa. En concreto los gatitos de entornos con una alta presión infectiva, tales como refugios de gatos, o de madres que se han vacunado de manera regular, por ejemplo en los criaderos, pueden seguir teniendo MDAs a las 16 o incluso a las 20 semanas de edad. En estas situaciones, se recomienda una tercera vacunación a los cuatro meses.

En gatos adultos con un historial de vacunación desconocido, es suficiente una única inyección seguida de una vacunación de refuerzo al año siguiente. A partir de entonces, pueden aplicarse las vacunaciones de refuerzo a intervalos de tres años o más.

## **Inmunidad del colectivo demasiado baja**

*“Hoy día, gracias a la eficacia de las vacunas, rara vez se observa la enfermedad. Pero el virus sigue acechando ahí fuera y podría – y puede – emerger ocasionalmente de manera inesperada”,* añadió el profesor Marian Horzinek (Utrecht, Países Bajos), presidente del ABCD. *“Con el fin de mantener a raya la enfermedad, el porcentaje de vacunación de cualquier población de gatos ha de ser tan alta como sea posible, y sin lugar a dudas más alta del 30% actual”.*

A parte del tratamiento de mantenimiento (fluidoterapia, antibióticos y posiblemente antiseros o antivíricos), no existe ninguna “cura” para la enfermedad, y los gatos pueden morir a pesar de los cuidados veterinarios. Sin embargo, las vacunas disponibles actualmente en el mercado son muy eficaces frente a la enfermedad, siempre y cuando se apliquen según el protocolo recomendado.

Para más información y descargarse el texto completo de las directrices sobre la panleucopenia felina del ABCD visite la web: [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org). Estas pautas también dan recomendaciones para situaciones específicas tales como gatos inmunocomprometidos, criaderos y gatos con un tratamiento de corticosteroides.

Estas pautas sobre panleucopenia felina se adoptaron en el tercer encuentro del ABCD, llevado a cabo en Haarlem (Países Bajos) del 8 al 9 de junio de 2006. En dicho encuentro la comisión también debatió sobre la enfermedad producida por herpesvirus felino, para la que actualmente se están preparando unas directrices a seguir.

---

### **Notas para los editores**

- El *Advisory Board on Cat Diseases* europeo es una comisión independiente de 17 destacados veterinarios de diez países europeos, expertos en inmunología, vacunación y/o medicina felina. El ABCD se constituyó para compilar las directrices de prevención y control de las principales enfermedades infecciosas felinas de Europa, basándose en el conocimiento científico actual.
- Para mayor información visite la web [www.abcd-vets.org](http://www.abcd-vets.org).
- Pueden disponer, si así lo solicitan, de entrevistas, fotos y del logo del ABCD.
- La compañía Merial de Salud Animal ha colaborado en la constitución del ABCD europeo y mantiene esta iniciativa mediante financiación. Merial es una compañía innovadora, líder mundial que proporciona una gama completa de productos para mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de una gran variedad de animales. Para más información, visite la web [www.merial.com](http://www.merial.com)

### **Para obtener más información por favor contacte con:**

- Karin de Lange - Jefe de Prensa/Prensa Veterinaria:  
Teléfono: + 33 299 07 87 10  
Correo electrónico I: [karin.delange@abcd-vets.org](mailto:karin.delange@abcd-vets.org)
- o:
- Mars Webb - Jefe de Comunicación/Medios de comunicación del consumidor:  
Teléfono: + 44 208 835 0372  
Correo electrónico: [mars.webb@abcd-vets.org](mailto:mars.webb@abcd-vets.org)